

XXII. Erkrankungen und Todesursachen

1. Erkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Infektionskrankheiten¹⁾

Jahr	Typhus und Paratyphus	Ruhr	Diphtherie	Scharlach	Polio-myelitis	Aktive Tuberkulose		Lebensmittelvergiftung		Meningitis epidemica	Virusmeningitis und Virusencephalitis *)	Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber		Bißverletzung und sonstige Kontakte durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
						Ins-gesamt	dar-unter aktive Tbk der At-mungs-organe	Sal-mo-nellen ¹⁾	Botu-lis-mus				nach standes-amtlich mel-de-pflichtiger Geburt	nach Fehl-ge-burt	
1950	5 462	1 727	19 283	74 768	452	92 760	80 113	5 786		396	124	.	140	383	.
1951	4 588	2 233	15 956	82 921	669	79 341	69 332	6 276		319	82	789	144	502	445
1952	3 272	642	12 473	55 078	507	67 394	59 122	5 980		238	54	3 218	106	435	528
1953	4 001	918	9 831	25 983	2 652	60 236	52 451	2 119	52	371	59	6 099	44	282	1 602
1954	3 808	1 252	10 530	39 142	1 141	52 041	45 350	1 657	49	357	88	8 362	31	211	1 664
1955	2 925	4 287	8 224	37 968	968	47 015	40 948	2 127	36	326	49	17 427	30	155	1 636
1956	2 554	2 912	6 369	23 244	675	41 383	36 162	1 289	29	291	60	28 954	20	132	3 412
1957	2 140	7 688	5 564	14 145	1 601	34 554	29 748	740	33	276	1 466	37 017	5	96	9 738
1958	1 541	2 366	4 258	15 764	958	29 750	25 719	616	13	252	546	34 269	13	108	6 912
1959	1 785	16 686	4 401	15 861	960	26 101	22 742	6 071	17	225	344	42 514	10	96	5 975
1960	1 063	7 642	3 786	15 170	131	23 418	20 361	5 171	19	192	321	45 424	6	65	7 931
1961	1 150	10 845	3 176	15 472	3	20 367	17 440	7 520	25	165	421	46 844	3	43	7 115
1962	755	18 008	1473	12 608	3	20 536	17 564	7 907	34	161	288	26 136	2	43	6 912
1963	918	9 139	771	15 964	—	19 566	16 781	10 549	21	175	1 096	27 594	.	.	5 927
1964	778	28 712	200	18 723	—	18 931	16 340	8 924	14	130	1 003	35 305	.	.	6 524
1965	612	9 574	107	22 403	—	15 933	13 444	9 006	32	102	520	43 264	.	.	7 147
1966	492	12 251	45	32 050	—	13 777	11 540	7 083	11	96	1 580	39 413	.	.	7 282
1967	482	9 825	19	27 357	—	12 868	10 569	6 541	5	74	3 192	30 292	.	.	5 850
1968	410	7 086	16	26 479	—	11 725	9 693	5 735	7	68	2 238	23 407	.	.	7 791

Je 10 000 der Bevölkerung²⁾

1950	3,0	0,9	10,5	40,7	0,2	50,4	43,6	3,1	0,2	0,06	.	0,14	0,37	.	
1951	2,5	1,2	8,7	45,2	0,4	43,2	37,8	3,4	0,2	0,04	0,4	0,14	0,49	0,2	
1952	1,8	0,4	6,8	30,1	0,3	36,8	32,3	3,3	0,1	0,02	1,8	0,10	0,43	0,3	
1953	2,2	0,5	5,4	14,3	1,5	33,4	29,0	1,2	0,03	0,2	0,03	3,4	0,04	0,28	0,9
1954	2,1	0,7	5,8	21,7	0,6	28,8	25,1	0,9	0,03	0,2	0,05	4,6	0,03	0,21	0,9
1955	1,6	2,4	4,6	21,2	0,5	26,2	22,8	1,2	0,02	0,2	0,03	9,7	0,03	0,16	0,9
1956	1,4	1,6	3,6	13,1	0,4	23,4	20,4	0,7	0,02	0,2	0,03	16,3	0,020	0,13	1,9
1957	1,2	4,4	3,2	8,1	0,9	19,7	17,0	0,4	0,02	0,2	0,84	21,1	0,005	0,10	5,5
1958	0,9	1,4	2,5	9,1	0,6	17,1	14,8	0,4	0,01	0,1	0,31	19,7	0,014	0,11	4,0
1959	1,0	9,6	2,5	9,2	0,6	15,1	13,1	3,5	0,01	0,1	0,20	24,6	0,010	0,10	3,5
1960	0,6	4,4	2,2	8,8	0,08	13,6	11,8	3,0	0,01	0,1	0,19	26,3	0,006	0,07	4,6
1961	0,7	6,3	1,9	9,0	0,002	11,9	10,2	4,4	0,01	0,1	0,25	27,4	0,003	0,05	4,2
1962	0,4	10,5	0,9	7,4	0,002	12,0	10,3	4,6	0,02	0,1	0,17	15,3	0,002	0,05	4,0
1963	0,5	5,3	0,4	9,3	—	11,4	9,8	6,1	0,01	0,1	0,64	16,1	.	.	3,5
1964	0,5	16,9	0,1	11,0	—	11,1	9,6	5,3	0,01	0,1	0,59	20,8	.	.	3,8
1965	0,3	5,6	0,1	13,2	—	9,4	7,9	5,3	0,02	0,1	0,31	25,4	.	.	4,2
1966	0,3	7,2	0,0	18,8	—	8,1	6,8	4,2	0,01	0,1	0,93	23,1	.	.	4,3
1967	0,3	5,6	0,0	16,0	—	7,5	6,2	3,8	0,00	0,0	1,87	17,7	.	.	3,4
1968	0,2	4,1	0,0	15,5	—	6,9	5,7	3,4	0,00	0,0	1,31	13,7	.	.	4,6

¹⁾ Ergebnisse für 1957 laut Veröffentlichung des Ministeriums für Gesundheitswesen in der Zeitschrift „Das Deutsche Gesundheitswesen“. — ²⁾ 1950 nur Virusencephalitis. — ^{*)} Kindbettfieber je 10000 der weiblichen Bevölkerung.