

2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen

| Jahr | Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen | | | | | |
|------|---|----------|----------|---|----------|----------|
| | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich |
| | | | | Je 10 000 der Bevölkerung ¹⁾ | | |
| 1955 | 39 703 | 16 343 | 23 360 | 22,10 | 20,35 | 23,51 |
| 1956 | 42 868 | 17 862 | 25 006 | 24,20 | 22,55 | 25,53 |
| 1957 | 45 118 | 19 055 | 26 063 | 25,76 | 24,30 | 26,93 |
| 1958 | 48 088 | 21 060 | 27 028 | 27,71 | 27,07 | 28,22 |
| 1959 | 47 512 | 20 955 | 26 557 | 27,47 | 26,96 | 27,88 |
| 1960 | 48 857 | 21 463 | 27 394 | 28,42 | 27,71 | 29,01 |
| 1961 | 48 212 | 21 335 | 26 877 | 28,15 | 27,63 | 28,58 |
| 1962 | 50 753 | 22 562 | 28 191 | 29,68 | 29,22 | 30,05 |
| 1963 | 55 117 | 24 842 | 30 275 | 32,13 | 32,00 | 32,23 |
| 1964 | 56 088 | 24 889 | 31 199 | 33,00 | 32,20 | 33,70 |
| 1965 | 56 625 | 25 479 | 31 146 | 33,25 | 32,81 | 33,63 |
| 1966 | 55 627 | 24 958 | 30 669 | 32,59 | 32,00 | 33,09 |
| 1967 | 58 848 | 26 602 | 32 246 | 34,45 | 34,02 | 34,81 |
| 1968 | 60 480 | 27 378 | 33 102 | 35,40 | 34,94 | 35,79 |

¹⁾ Gleichen Geschlechts.

3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Bezirken

| Jahr Bezirk | Syphilis | | Gonorrhoe | | Syphilis | | Gonorrhoe | |
|----------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|-----------|--|
| | Insgesamt ¹⁾ | darunter an- steckungs- fähig ²⁾ | Insgesamt ¹⁾ | darunter an- steckungs- fähig ²⁾ | Insgesamt | darunter an- steckungs- fähig | Insgesamt | darunter an- steckungs- fähig |
| | | | | | | | | |
| 1950 | 12 333 | 4 164 | 27 945 | 23 669 | 6,7 | 2,3 | 15,2 | 12,9 |
| 1951 | 9 066 | 2 306 | 30 131 | 29 639 | 4,9 | 1,3 | 16,4 | 16,2 |
| 1952 | 7 980 | 1 841 | 38 939 | 38 274 | 4,4 | 1,0 | 21,2 | 20,9 |
| 1953 | 6 786 | 1 510 | 43 830 | 43 316 | 3,7 | 0,8 | 24,1 | 23,8 |
| 1954 | 6 004 | 1 180 | 40 014 | 39 500 | 3,3 | 0,7 | 22,2 | 21,9 |
| 1955 | 5 192 | 769 | 36 690 | 36 012 | 2,9 | 0,4 | 20,4 | 20,1 |
| 1956 | 4 233 | 501 | 33 608 | 33 069 | 2,4 | 0,3 | 19,0 | 18,7 |
| 1957 | 3 435 | 398 | 32 075 | 31 656 | 2,0 | 0,2 | 18,3 | 18,1 |
| 1958 | 3 180 | 282 | 28 167 | 27 820 | 1,8 | 0,2 | 16,2 | 16,0 |
| 1959 | 2 675 | 332 | 26 973 | 26 624 | 1,5 | 0,2 | 15,6 | 15,4 |
| 1960 | 2 183 | 192 | 25 736 | 25 464 | 1,3 | 0,1 | 14,9 | 14,8 |
| 1961 | 441 | 175 | 24 893 | 24 855 | 0,3 | 0,1 | 14,5 | 14,5 |
| 1962 | 399 | 202 | 22 618 | 22 588 | 0,2 | 0,1 | 13,2 | 13,2 |
| 1963 | 269 | 130 | 22 085 | 22 054 | 0,2 | 0,1 | 12,9 | 12,9 |
| 1964 | 322 | 144 | 20 926 | 20 913 | 0,2 | 0,1 | 12,3 | 12,3 |
| 1965 | 336 | 199 | 19 627 | 19 611 | 0,2 | 0,1 | 11,5 | 11,5 |
| 1966 | 396 | 234 | 18 880 | 18 867 | 0,2 | 0,1 | 11,1 | 11,1 |
| 1967 | 388 | 244 | 18 356 | 18 347 | 0,2 | 0,1 | 10,8 | 10,7 |
| 1968 | 336 | 186 | 20 219 | 20 213 | 0,2 | 0,1 | 11,8 | 11,8 |

Nach Bezirken 1968

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|-------|-------|------|------|------|------|
| Hauptstadt Berlin | 99 | 46 | 2 980 | 2 980 | 0,91 | 0,43 | 27,5 | 27,5 |
| Rostock | 26 | 21 | 1 295 | 1 294 | 0,31 | 0,25 | 15,2 | 15,2 |
| Schwern | 6 | — | 391 | 390 | 0,10 | — | 6,5 | 6,5 |
| Neubrandenburg | 2 | 1 | 350 | 350 | 0,03 | 0,02 | 5,5 | 5,5 |
| Potsdam | 14 | 5 | 1 335 | 1 335 | 0,12 | 0,04 | 11,8 | 11,8 |
| Frankfurt | 15 | 10 | 756 | 755 | 0,22 | 0,15 | 11,3 | 11,2 |
| Cottbus | 13 | 10 | 757 | 757 | 0,15 | 0,12 | 8,9 | 8,9 |
| Magdeburg | 20 | 8 | 1 239 | 1 238 | 0,15 | 0,06 | 9,4 | 9,3 |
| Halle | 25 | 4 | 2 371 | 2 371 | 0,13 | 0,02 | 12,3 | 12,3 |
| Erfurt | 9 | 9 | 1 516 | 1 516 | 0,07 | 0,07 | 12,1 | 12,1 |
| Gera | 29 | 22 | 701 | 701 | 0,39 | 0,30 | 9,5 | 9,5 |
| Suhl | 1 | 1 | 282 | 282 | 0,02 | 0,02 | 5,1 | 5,1 |
| Dresden | 17 | 11 | 2 059 | 2 058 | 0,09 | 0,06 | 10,9 | 10,9 |
| Leipzig | 39 | 32 | 1 985 | 1 985 | 0,26 | 0,21 | 13,2 | 13,2 |
| Karl-Marx-Stadt | 21 | 6 | 2 202 | 2 201 | 0,10 | 0,03 | 10,6 | 10,6 |

¹⁾ Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Frühsyphilis und der Connata-Frühform sowie der imbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. — ²⁾ Syphilis connata Frühform A 5 a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per-acta-Fälle. — ³⁾ G 1 a akute Gonorrhoe, G 1 b chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G 1 c Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.