

4. Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene													
	Ins- gesamt	darunter nach Todesursachen												
		Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten (ohne Tbk) ¹⁾	Tuberkulose		Zere- bro- vasku- läre Krank- heit ²⁾	Pneu- monie	Krank- heiten des Kreis- lauf- systems	dar- unter Krank- heiten der Arterien, Arterio- le n und Kapil- laren	Magen- unü- Zwölf- finger- darm- ge- schwür	Diab- etes melli- tus	Bös- artige Neo- plas- men	Kompli- kationen der Schwan- gerschaft, der Geburt und des Wochen- betts	Un- fall- folgen	Alters- schwä- che
1950	219 582	5 749	14 439	12 156	24 493	12 955	.	.	2 026	.	31 582	.	8 705	13 690
1955	214 066	4 029	4 572	4 079	30 549	10 190	.	.	1 844	.	34 142	.	5 739	17 356
1960	233 759	4 793	3 158	2 858	31 769	11 780	.	.	1 640	.	36 876	.	5 833	21 180
1965	230 254	2 201	2 694	2 421	31 354	7 432	.	.	1 968	.	39 624	.	6 877	9 609
1966	225 663	1 408	2 118	1 847	31 073	5 221	.	.	2 065	.	40 409	.	6 386	7 959
1967	227 068	1 324	2 053	1 780	30 292	4 932	.	.	2 046	.	41 314	.	6 842	6 605
1968	242 473	1 122	2 048	1 593	20 073	4 097	108 267	34 739	1 949	2 538	39 617	126	9 155	5 708
1969	243 732	1 066	2 030	1 472	16 406	4 612	110 454	40 933	1 925	3 563	37 639	100	9 801	4 456

männlich

1950	108 428	2 891	8 694	7 589	10 160	6 696	.	.	1 671	.	13 915	X	5 334	5 262
1955	104 843	1 954	2 995	2 751	12 710	5 330	.	.	1 467	.	16 097	X	3 996	6 729
1960	114 496	2 382	2 206	2 038	13 018	6 115	.	.	1 191	.	18 148	X	4 130	8 146
1965	111 129	1 049	1 859	1 747	12 687	3 566	.	.	1 340	.	19 867	X	4 064	3 569
1966	107 849	644	1 470	1 343	12 321	2 513	.	.	1 406	.	20 247	X	4 010	2 761
1967	108 541	600	1 338	1 234	11 891	2 373	.	.	1 378	.	20 692	X	4 290	2 284
1968	115 156	577	1 446	1 169	8 028	2 158	48 025	14 391	1 297	766	20 055	X	4 917	1 955
1969	115 538	521	1 435	1 066	6 553	2 300	48 315	17 143	1 264	1 097	18 966	X	5 262	1 566

weiblich

1950	111 154	2 858	5 745	4 567	14 333	6 259	.	.	355	.	17 667	.	3 371	8 428
1955	109 223	2 075	1 577	1 328	17 839	4 860	.	.	377	1 196	18 045	403	1 743	10 627
1960	119 263	2 411	952	820	18 751	5 665	.	.	449	1 797	18 728	287	1 703	13 034
1965	119 125	1 152	835	674	18 607	3 866	.	.	628	3 141	19 757	176	2 813	6 040
1966	117 814	764	648	504	18 752	2 708	.	.	659	2 914	20 162	154	2 376	5 198
1967	118 527	724	715	546	18 401	2 559	.	.	668	3 113	20 622	159	2 552	4 321
1968	127 317	545	602	424	12 045	1 939	60 242	20 348	652	1 772	19 562	126	4 238	3 753
1969	128 194	545	595	406	9 853	2 312	62 139	23 790	661	2 466	18 673	100	4 539	2 890

Je 10 000 der Bevölkerung

1950	119,3	3,1	7,8	6,6	13,3	7,0	.	.	1,1	.	17,2	³⁾ 20,6	4,7	7,4
1955	119,3	2,2	2,5	2,3	17,0	5,7	.	.	1,0	1,0	19,0	³⁾ 13,7	3,2	9,7
1960	135,6	2,8	1,8	1,7	18,4	6,8	.	.	1,0	1,6	21,4	³⁾ 9,8	3,4	12,3
1965	135,2	1,8	1,6	1,4	18,4	4,4	.	.	1,2	2,7	23,3	³⁾ 6,3	4,0	5,6
1966	132,2	0,8	1,2	1,1	18,2	3,1	.	.	1,2	2,5	23,7	³⁾ 5,7	3,7	4,7
1967	132,9	0,8	1,2	1,0	17,7	2,6	.	.	1,2	2,7	24,2	³⁾ > 6,3	4,0	3,0
1968	141,9	0,7	1,2	0,9	11,8	2,4	63,4	20,3	1,1	1,5	23,2	³⁾ 5,1	5,4	3,3
1969	142,7	0,6	1,2	0,9	9,6	2,7	64,7	24,0	1,1	2,1	22,0	³⁾ 4,2	5,7	2,6 ⁴⁾

männlich ⁴⁾

1950	132,8	3,5	10,6	9,3	12,4	8,2	.	.	2,0	.	17,0	X	6,5	6,4
1955	130,8	2,4	3,7	3,4	15,9	6,6	.	.	1,8	0,8	20,1	X	5,0	8,4
1960	147,5	3,1	2,8	2,6	16,8	7,9	.	.	1,5	1,2	23,4	X	5,3	10,5
1965	143,1	1,4	2,4	2,2	16,3	4,6	.	.	1,7	1,8	25,6	X	5,2	4,6
1966	138,3	0,8	1,9	1,7	15,8	3,2	.	.	1,8	1,8	26,0	X	5,1	3,5
1967	138,8	0,8	1,7	1,6	15,2	3,0	.	.	1,8	1,9	26,5	X	5,5	2,9
1968	147,0	0,7	1,8	1,5	10,2	2,8	61,3	18,4	1,7	1,0	25,6	X	6,3	2,5
1969	147,3	0,7	1,8	1,4	8,4	2,9	61,6	21,9	1,6	1,4	24,2	X	6,7	2,0

weiblich ⁴⁾

1950	108,6	2,8	5,6	4,5	14,0	6,1	.	.	0,3	.	17,3	.	3,3	8,2
1955	110,0	2,1	1,6	1,3	18,0	4,9	.	.	0,4	1,2	18,2	.	1,8	10,7
1960	125,8	2,5	1,0	0,9	19,8	6,0	.	.	0,5	1,9	19,8	0,3	1,8	13,7
1965	128,6	1,2	0,9	0,7	20,2	4,2	.	.	0,7	3,4	21,3	0,2	3,0	6,5
1966	127,1	0,8	0,7	0,5	20,2	2,9	.	.	0,7	3,1	21,8	0,2	2,6	5,6
1967	128,0	0,8	0,8	0,6	19,9	2,8	.	.	0,7	3,4	22,3	0,2	2,8	4,7
1968	137,6	0,6	0,7	0,5	13,0	2,1	65,1	22,0	0,7	1,9	21,1	0,1	4,6	4,1
1969	138,9	0,6	0,6	0,4	10,7	2,5	67,3	25,8	0,7	2,7	20,2	0,1	4,9	3,1

¹⁾ Bis 1967 Infektionskrankheiten (ohne Tbk). — ²⁾ Bis 1967 Gehirnblutung. — ³⁾ Müttersterblichkeit (gestorbene Mütter je 10 000 Lebendgeborene). — ⁴⁾ Je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts.