

2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen

Jahr	Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen							
	Insgesamt		männlich	weiblich	Insgesamt		männlich	weiblich
	Je 10 000 der Bevölkerung ¹⁾							
1955	39 703	16 343	23 360	22,10	20,35	23,51		
1960	48 857	21 463	27 394	28,42	27,71	29,01		
1965	56 625	25 479	31 146	33,25	32,81	33,63		
1966	55 627	24 958	30 669	32,59	32,00	33,09		
1967	58 848	26 602	32 246	34,45	34,02	34,81		
1968	60 480	27 378	33 102	35,40	34,94	35,79		
1969	59 645	26 706	32 939	34,93	34,04	35,68		
1970	60 054	26 560	33 494	35,21	33,83	36,38		
1971	64 772	28 440	36 332	37,99	36,18	39,54		
1972	62 556	27 580	34 976	36,70	35,02	38,15		
1973	63 099	27 335	35 764	37,16	34,78	39,21		
1974	63 542	27 548	35 994	37,54	35,12	39,64		
1975	65 179	28 289	36 890	38,68	36,16	40,87		
1976	66 144	28 775	37 369	39,40	36,86	41,62		
1977	65 036	27 688	37 348	38,79	35,44	41,72		
1978	64 306	27 515	36 791	38,38	35,16	41,20		
1979	64 470	27 652	36 818	38,50	35,29	41,32		
1980	63 387	26 834	36 553	37,87	34,20	41,12		

*) Gleichen Geschlechts.

3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Bezirken

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt ¹⁾	darunter ansteckungsfähig ¹⁾	Insgesamt ¹⁾	darunter ansteckungsfähig ²⁾	Insgesamt	darunter ansteckungsfähig	Insgesamt	darunter ansteckungsfähig
1950	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1960	2 183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8
1965	336	199	19 627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,5
1966	396	234	18 880	18 867	0,2	0,1	11,1	11,1
1967	388	244	18 356	18 347	0,2	0,1	10,8	10,7
1968	336	186	20 219	20 213	0,2	0,1	11,8	11,8
1969	283	159	21 851	21 846	0,2	0,1	12,8	12,8
1970	299	180	23 457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1971	381	230	27 717	27 709	0,2	0,1	16,3	16,3
1972	345	220	35 097	35 087	0,2	0,1	20,6	20,6
1973	554	383	40 596	40 587	0,3	0,2	23,9	23,9
1974	496	324	40 745	40 726	0,3	0,2	24,1	24,1
1975	375	244	39 249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3
1976	417	241	41 386	41 375	0,2	0,1	24,7	24,6
1977	574	388	45 209	45 190	0,3	0,2	27,0	27,0
1978	970	675	49 514	49 494	0,6	0,4	29,5	29,5
1979	912	607	50 638	50 621	0,5	0,4	30,2	30,2
1980	951	564	50 861	50 835	0,6	0,3	30,4	30,4
1981	758	463	50 302	50 287	0,5	0,3	30,1	30,0

Nach Bezirken 1981

Hauptstadt Berlin ...	160	60	6 189	6 189	1,4	0,5	53,5	53,5
Cottbus	17	8	2 810	2 806	0,2	0,1	31,8	31,7
Dresden	98	54	4 832	4 829	0,5	0,3	26,8	26,8
Erfurt	26	14	2 764	2 764	0,2	0,1	22,3	22,3
Frankfurt	26	17	1 974	1 973	0,4	0,2	27,9	27,9
Gera	8	5	1 714	1 712	0,1	0,1	23,1	23,1
Halle	82	64	5 136	5 136	0,4	0,3	28,1	28,1
Karl-Marx-Stadt	57	33	4 196	4 196	0,3	0,2	21,8	21,8
Leipzig	151	116	4 692	4 692	1,1	0,8	33,3	33,3
Magdeburg	23	10	3 907	3 906	0,2	0,1	30,8	30,8
Neubrandenburg	5	2	1 715	1 713	0,1	0,0	27,5	27,5
Potsdam	34	31	3 932	3 932	0,3	0,3	35,1	35,1
Rostock	48	28	3 964	3 963	0,5	0,3	44,5	44,5
Schwerin	11	9	1 579	1 579	0,2	0,2	26,8	26,8
Suhl	12	12	898	897	0,2	0,2	16,4	16,3

¹⁾ Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Frühsyphilis und der Connata-Frühform sowie der unbehandeltem Gonokokkeninfektion erfaßt. — ²⁾ Syphilis conuata Frühform A 5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per-acta-Fälle. — ³⁾ G la akute Gonorrhoe, Gib chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G lc Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.