

2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen¹⁾

Jahr	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt männlich weiblich		
				Je 10 000 der Bevölkerung ⁸⁾		
1955	40129	16 960	23 169	22,36	21,15	23,34
1956	40 395	17 137	23 258	22,80	21,63	23,75
1957	43 026	18 627	24 399	24,56	23,76	25,21
1958	44 860	19 478	25 382	25,85	25,04	26,51
1959	43 932	19 515	24 417	25,40	25,11	25,63
1960	45 328	20 179	25 149	26,29	26,00	26,53
1961	45 835	20 600	25 235	26,77	26,68	26,83
1962	47 304	21411	25 893	27,66	27,73	27,00
1963	48 917	22 338	26 579	28,51	28,78	28,30
1964	49 744	22 758	26 986	29,29	29,44	29,16
1965	48 985	22 535	26 450	28,78	29,03	28,57
1966	50 046	22 764	27 282	29,34	29,20	29,45
1967	51 898	23 760	28 136	30,38	30,38	30,38
1968	52 893	24 572	28 321	30,96	31,36	30,62
1969	53 035	24 603	28 432	31,06	31,36	30,80
1970	53 076	24 212	28 864	31,11	30,84	31,35
1971	53 478	24 599	28 879	31,35	31,26	31,42
1972	53 233	24 502	28 731	31,23	31,11	31,34
1973	53 622	24 602	29 020	31,58	31,31	31,82
1974	53 804	24 610	29 194	31,79	31,37	32,15
1975	54 979	25 186	29 793	32,63	32,20	33,00
1976	55 121	25 340	29 781	32,84	32,46	33,17
1977	54 523	24 803	29 720	32,52	31,74	33,20
1978	52 893	24 121	28 772	31,57	30,82	32,22
1979	52 219	23 854	28 365	31,19	30,45	31,84
1980	52 368	23 757	28 611	31,29	30,28	32,18
1981	51 652	23 163	28 489	30,86	29,46	32,11
1982	52 356	23 687	28 669	31,36	30,17	32,41

*) Umstellung auf das Krebsregister entsprechend der internationalen Methodik; ohne Basaliome der Haut. — *) Gleichen Geschlechts.

3. Neugemeldete Erkrankungen an i Syphilis und Gonorrhoe

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis			Gonorrhoe	
	Ins- gesamt ¹⁾	darunter Ins- an- gesamt ¹⁾ stecklings- fähig ⁸⁾	darunter an- gesamt ¹⁾	darunter an- steckungs- fähig ³⁾	Ins- gesamt	darunter an- steckungs- fähig	Ins- gesamt	darunter an- steckungs- fähig	
Je 10 000 der Bevölkerung									
1950	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9	
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1	
1960	2183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8	
1965	336	199	19 627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,5	
1970	299	180	23 457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7	
1975	375	244	39 249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3	
1976	417	241	41 386	41 375	0,2	0,1	24,7	24,6	
1977	574	388	45 209	45 190	0,3	0,2	27,0	27,0	
1978	970	675	49 514	49 494	0,6	0,4	29,5	29,5	
1979	912	607	50 638	50 621	0,5	0,4	30,2	30,2	
1980	951	564	50 861	50 835	0,6	0,3	30,4	30,4	
1981	758	463	50 302	50 287	0,5	0,3	30,1	30,0	
1982	516	305	50 086	50 071	0,3	0,2	30,0	30,0	
1983	428	196	50 299	50 293	0,3	0,1	30,1	30,1	
1984	342	180	49 089	49 078	0,2	0,1	29,4	29,4	
Nach Bezirken 1984									
Hauptstadt Berlin ...	88	29	6 938	6 938	0,7	0,2	58,3	58,3	
Cottbus	13	8	2 322	2 321	0,1	0,1	26,3	26,3	
Dresden	47	27	4 695	4 694	0,3	0,2	26,3	26,3	
Erfurt	0	0	2 823	2 823	0,0	0,0	22,8	22,8	
Frankfurt	11	4	2 048	2 048	0,2	0,1	28,9	28,9	
Gera	1	1	1 892	1 892	0,0	0,0	25,5	25,5	
Halle	16	7	1 419	1 417	0,1	0,0	24,5	24,5	
Karl-Marx-Stadt	41	26	4 131	4 128	0,2	0,1	21,8	21,8	
Leipzig	59	42	4 417	4 416	0,4	0,3	31,8	31,8	
Magdeburg	9	4	3 925	3 924	0,1	0,0	31,2	31,2	
Neubrandenburg	0	6	1 334	1 334	0,1	0,1	21,5	21,5	
Potsdam	22	14	3 164	3 163	0,2	0,1	28,2	28,2	
Rostock	21	9	3 994	3 994	0,2	0,1	44,5	44,5	
Schwerin	1	—	1 721	1 720	0,0	—	29,1	29,1	
Suhl	1	1	1 266	1 266	0,0	0,0	23,0	23,0	

*) Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Frühsyphilis und der (Jonnata-Frühform sowie der unbehandelten Gouokokkeninfektion erfaßt. — *) Syphilis connata Frühform A 5 a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per-acta-Fälle. — *)Gla akute Gonorrhoe, Gib chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G lc Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.