

Neugemeldete meldepflichtige bösartige Geschwulsterkrankungen<sup>1)</sup>

Jahr	Insgesamt			Je 10 000 der Bevölkerung <sup>2)</sup>		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
1955	40 129	16 960	23 169	22,36	21,15	23,34
1960	45 328	20 179	25 149	26,29	26,00	26,53
1965	48 776	22 467	26 309	28,61	28,93	28,41
1970	53 640	24 518	29 122	31,45	31,23	31,63
1971	54 227	25 021	29 206	31,81	31,83	31,79
1972	54 574	25 244	29 330	32,02	32,06	31,99
1973	54 496	25 114	29 382	32,09	31,96	32,21
1974	54 744	25 132	29 612	32,35	32,04	32,61
1975	55 558	25 512	30 046	32,97	32,62	33,28
1976	55 546	25 559	29 987	33,09	32,74	33,40
1977	55 442	25 308	30 134	33,07	32,39	33,67
1978	53 801	24 610	29 191	32,11	31,44	32,69
1979	53 100	24 309	28 791	31,71	31,02	32,31
1980	53 318	24 270	29 048	31,86	30,93	32,67
1981	53 686	24 153	29 533	32,08	30,71	33,29
1982	53 731	24 456	29 275	32,18	31,15	33,10
1983	54 397	24 785	29 612	32,58	31,50	33,53
1984	54 846	24 904	29 942	32,90	31,65	34,01
1985	53 649	24 365	29 284	32,23	30,96	33,38
1986	53 908	24 937	28 971	32,43	31,64	33,13

1) Auf der Grundlage des Krebsregistersentsprechend der internationalen Methodik; ohne Basaliome der Haut. - 2) Gleichen Geschlechts.

## Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt <sup>1)</sup>	darunter an-an-steckungs-fähig <sup>2)</sup>	Insgesamt <sup>1)</sup>	darunter an-an-steckungs-fähig <sup>2)</sup>	Insgesamt	darunter an-an-steckungs-fähig	Insgesamt	darunter an-an-steckungs-fähig
1950	12 333	4 164	27945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1955	5 192	769	36690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1960	2 183	192	25736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8
1965	336	199	19627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,5
1970	299	180	23457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1975	375	244	39249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3
1980	951	564	50861	50 835	0,6	0,3	30,4	30,4
1981	758	463	50302	50 287	0,5	0,3	30,1	30,0
1982	516	305	50086	50 071	0,3	0,2	30,0	30,0
1983	428	196	50299	50 293	0,3	0,1	30,1	30,1
1984	342	180	49089	49 078	0,2	0,1	29,4	29,4
1985	327	156	49616	49 606	0,2	0,1	29,8	29,8
1986	419	269	44668	44 654	0,3	0,2	26,9	26,9
1987	596	335	34919	34 914	0,4	0,2	20,9	20,9
1988	837	511	28635	28 633	0,5	0,3	17,2	17,2

## Nach Bezirken 1988

Hauptstadt Berlin	53	0	3 324	3 324	0,4	0,0	26,2	26,2
Cottbus	22	18	1 502	1 502	0,3	0,2	17,0	17,0
Dresden	50	25	2 740	2 740	0,3	0,1	15,5	15,5
Erfurt	25	23	1 948	1 948	0,2	0,2	15,7	15,7
Frankfurt	11	6	1 040	1 040	0,2	0,1	14,6	14,6
Gera	15	12	966	966	0,2	0,2	13,0	13,0
Halle	74	45	3 145	3 145	0,4	0,3	17,7	17,7
Karl-Marx-Stadt	75	28	2 246	2 246	0,4	0,2	12,1	12,1
Leipzig	428	304	2 528	2 528	3,1	2,2	18,5	18,5
Magdeburg	31	16	2 443	2 442	0,3	0,1	19,6	19,5
Neubrandenburg	15	15	967	967	0,2	0,2	15,6	15,6
Potsdam	8	6	1 789	1 789	0,1	0,1	15,9	15,9
Rostock	21	9	2 485	2 484	0,2	0,1	27,2	27,2
Schwerin	5	3	898	898	0,1	0,1	15,1	15,1
Suhl	4	1	614	614	0,1	0,0	11,2	11,2

1) Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Frühsyphilis und der Connata-Frühform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt.  
 2) Syphilis connata Frühform A 5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis III florida recidiva - ohne peracta-Fälle. - 3) G 1a akute Gonorrhoe, G 1b chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G 1c Gonokokkeninfektion der Augen - unbehandelt.