

## XXII. Erkrankungen und Todesursachen

### 1. Erkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Infektionskrankheiten 1950 bis 1964<sup>1</sup>

Jahr	Typhus und Paratyphus	Ruhr	Diphtherie	Scharlach	Polio- mye- litis	Aktive Tuberkulose		Lebens- mittel- vergiftung		Men- in- gitis epide- mica	Virus- ence- phali- tis <sup>*)</sup>	Hepa- titis infectiosa	Kindbett- fieber		Bißver- letzung und sonstige Kontakte durch toll- wütige oder tollwut- ver- dächtige Tiere
						Ins- gesamt	dar- unter aktive Tbk der At- mungs- organe	Sal- mo- nel- len <sup>1)</sup>	Botu- lis- mus				nach standes- amtlich melde- pflich- tiger Geburt	nach Fehl- geburt	
1950	5 462	1 727	19 283	74 768	452	92 760	80 113	5 786	396	124	.	140	383	.	
1951	4 588	2 233	15 956	82 921	669	79 341	69 332	6 276	319	82	789	144	502	445	
1952	3 272	642	12 473	55 078	507	67 394	59 122	5 980	238	54	3 218	106	435	528	
1953	4 001	918	9 831	25 983	2 652	60 236	52 451	2 119	52	371	59 6 099	44	282	1 602	
1954	3 808	1 252	10 530	39 142	1 141	52 041	45 350	1 657	49	357	88 8 362	31	211	1 664	
1955	2 925	4 287	8 224	37 968	968	47 015	40 948	2 127	36	326	49 17 427	30	155	1 636	
1956	2 554	2 912	6 369	23 244	675	41 383	36 162	1 289	29	291	60 28 954	20	132	3 412	
1957	2 140	7 688	5 564	14 145	1 601	34 554	29 748	740	33	276	1 466 37 017	5	96	9 738	
1958	1 541	2 366	4 258	15 764	958	29 750	25 719	616	13	252	546 34 269	13	108	6 912	
1959	1 785	16 686	4 401	15 861	960	26 101	22 742	6 071	17	225	344 42 514	10	96	5 975	
1960	1 063	7 642	3 786	15 170	131	23 418	20 361	5 171	19	192	321 45 424	6	65	7 931	
1961	1 150	10 845	3 176	15 472	3	20 367	17 440	7 520	25	165	421 46 844	3	43	7 115	
1962	755	18 008	1 473	12 608	3	20 536	17 564	7 907	34	161	288 26 136	2	43	6 912	
1963	918	9 139	771	15 964	-	19 566	16 781	10 549	21	175	1 096 27 594	.	.	5 927	
1964	778	28 712	200	18 723	-	...	...	8 924	14	130	1 003 35 305	.	.	6 524	

#### Je 10 000 der Bevölkerung<sup>\*)</sup>

1950	3,0	0,9	10,5	40,7	0,2	50,4	43,6	3,1	0,2	0,06	.	0,14	0,37	.	
1951	2,5	1,2	8,7	45,2	0,4	43,2	37,8	3,4	0,2	0,04	0,4	0,14	0,49	0,2	
1952	1,8	0,4	6,8	30,1	0,3	36,8	32,3	3,3	0,1	0,02	1,8	0,10	0,43	0,3	
1953	2,2	0,5	5,4	14,3	1,5	33,4	29,0	1,2	0,03	0,2	0,03	3,4	0,04	0,28	0,9
1954	2,1	0,7	5,8	21,7	0,6	28,8	25,1	0,9	0,03	0,2	0,05	4,6	0,03	0,21	0,9
1955	1,6	2,4	4,6	21,2	0,5	26,2	22,8	1,2	0,02	0,2	0,03	9,7	0,03	0,16	0,9
1956	1,4	1,6	3,6	13,1	0,4	23,4	20,4	0,7	0,02	0,2	0,03	16,3	0,020	0,13	1,9
1957	1,2	4,4	3,2	8,1	0,9	19,7	17,0	0,4	0,02	0,2	0,84	21,1	0,005	0,10	5,5
1958	0,9	1,4	2,5	9,1	0,6	17,1	14,8	0,4	0,01	0,1	0,31	19,7	0,014	0,11	4,0
1959	1,0	9,6	2,5	9,2	0,6	15,1	13,1	3,5	0,01	0,1	0,20	24,6	0,010	0,10	3,5
1960	0,6	4,4	2,2	8,8	0,08	13,6	11,8	3,0	0,01	0,1	0,19	26,3	0,006	0,07	4,6
1961	0,7	6,3	1,9	9,0	0,002	11,9	10,2	4,4	0,01	0,1	0,25	27,4	0,003	0,05	4,2
1962	0,4	10,5	0,9	7,4	0,002	12,0	10,3	4,6	0,02	0,1	0,17	15,3	0,002	0,05	4,0
1963	0,5	5,3	0,4	9,3	-	11,4	9,8	6,1	0,01	0,1	0,64	16,1	.	.	3,5
1964	0,5	16,9	0,1	11,0	-	...	...	5,3	0,01	0,1	0,59	20,8	.	.	3,8

<sup>1)</sup> Ergebnisse für 1957 laut Veröffentlichung des Ministeriums für Gesundheitswesen in der Zeitschrift „Das Deutsche Gesund-  
heitswesen“. — <sup>\*)</sup> Ab 1951 Virusmeningitis und Virusencephalitis. — <sup>\*)</sup> Kindbettfieber je 10 000 der weiblichen Bevölkerung.