

2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen

Jahr	Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen					
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
				Je 10 000 der Bevölkerung ¹⁾		
1955	39 703	16 343	23 360	22,10	20,35	23,51
1956	42 868	17 862	25 006	24,20	22,55	25,53
1957	45 118	19 055	26 063	25,76	24,30	26,93
1958	48 088	21 060	27 028	27,71	27,07	28,22
1959	47 512	20 955	26 557	27,47	26,96	27,88
1960	48 857	21 463	27 394	28,42	27,71	29,01
1961	48 212	21 335	26 877	28,15	27,63	28,58
1962	50 753	22 562	28 191	29,68	29,22	30,05
1963	55 117	24 842	30 275	32,13	32,00	32,23
1964	56 088	24 889	31 199	33,00	32,20	33,70
1965	56 625	25 479	31 146	33,25	32,81	33,63
1966	55 627	24 958	30 669	32,59	32,00	33,09
1967	58 848	26 602	32 246	34,45	34,02	34,81

*) Gleichen Geschlechts.

3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Bezirken

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt ¹⁾	darunter an- steckungs- fähig ²⁾	Insgesamt ¹⁾	darunter an- steckungs- fähig ²⁾	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig
					Je 10 000 der Bevölkerung			
1950	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1951	9 066	2 306	30 131	29 639	4,9	1,3	16,4	16,2
1952	7 980	1 841	38 939	38 274	4,4	1,0	21,2	20,9
1953	6 786	1 510	43 830	43 316	3,7	0,8	24,1	23,8
1954	6 004	1 180	40 014	39 500	3,3	0,7	22,2	21,9
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1956	4 233	501	33 608	33 069	2,4	0,3	19,0	18,7
1957	3 435	398	32 075	31 656	2,0	0,2	18,3	18,1
1958	3 180	282	28 167	27 820	1,8	0,2	16,2	16,0
1959	2 675	332	26 973	26 624	1,5	0,2	15,6	15,4
1960	2 183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8
1961	441	175	24 893	24 855	0,3	0,1	14,5	14,5
1962	399	202	22 618	22 588	0,3	0,1	13,2	13,2
1963	269	130	22 085	22 054	0,2	0,1	12,9	12,9
1964	322	144	20 926	20 913	0,2	0,1	12,3	12,3
1965	336	199	19 627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,5
1966	396	234	18 880	18 867	0,2	0,1	11,1	11,1
1967	388	244	18 356	18 347	0,2	0,1	10,8	10,7

Nach Bezirken 1967

Hauptstadt Berlin	100	63	2 515	2 514	0,93	0,58	23,3	23,3
Rostock	27	24	1 240	1 240	0,32	0,28	14,6	14,0
Schwerin	13	6	517	517	0,22	0,10	8,6	8,6
Xeubrandenburg	1	—	318	318	0,02	—	5,0	5,0
Potsdam	18	4	1 102	1 098	0,16	0,04	9,7	9,7
Frankfurt	13	8	700	699	0,19	0,12	10,5	10,5
Cottbus	10	6	799	799	0,12	0,07	9,5	9,5
Magdeburg	14	6	966	966	0,11	0,05	7,3	7,3
Halle	40	16	2 157	2 157	0,21	0,08	11,2	11,2
Erfurt	9	6	1 339	1 339	0,07	0,05	10,7	10,7
Gera	31	27	524	524	0,42	0,37	7,1	7,1
Suhl	4	4	240	240	0,07	0,07	4,4	4,4
Dresden	28	17	1 806	1 805	0,15	0,09	9,6	9,6
Leipzig	53	36	2 000	1 998	0,35	0,24	13,2	13,2
Karl-Marx-Stadt	27	21	2 133	2 133	0,13	0,10	10,3	10,3

i) Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Frühsyphilis und der Connata-Frühform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. -²⁾ Syphilis connata Frühform A 5 a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva - ohne per-acta-Fälle. -³⁾ G 1 a akute Gonorrhoe, Gib chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G 1 d Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.