

2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen

Jahr	Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen					
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt ; männlich		weiblich
				Je 10 000 der Bevölkerung ¹⁾		
1955	39 703	16 343	23 360	22,10	20,35	23,51
1956	42 868	17 862	25 006	24,20	22,55	25,53
1957	45 118	19 055	26 063	25,76	24,30	26,93
1958	48 088	21 060	27 028	27,71	27,07	28,22
1959	47 512	20 955	26 557	27,47	26,96	27,88
1960	48 857	21 463	27 394	28,42	27,71	29,01
1961	48 212	21 335	26 877	28,15	27,63	28,58
1962	50 753	22 562	28 191	29,68	29,22	30,05
1963	55 117	24 842	30 275	32,13	32,00	32,23
1964	56 088	24 889	31 199	33,00	32,20	33,70
1965	56 625	25 479	31 146	33,25	32,81	33,63
1966	55 627	24 958	30 669	32,59	32,00	33,09
1967	58 848	26 602	32 246	34,45	34,02	34,81
1968	60 480	27 378	33 102	35,40	34,94	35,79
1969	59 645	26 706	32 939	34,93	34,04	35,68
1970	60 054	26 560	33 494	35,21	33,83	36,38
1971	64 772	28 440	36 332	37,99	36,18	39,54
1972	62 556	27 580	34 976	36,70	35,02	38,15
1973	63 099	27 335	35 764	37,16	34,78	39,21
1974	63 542	27 548	35 994	37,54	35,12	39,64

*) Gleichen Geschlechts.

3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Bezirken

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt ¹⁾	darunter Ins- gesamt ¹⁾ an- steckungs- fähig ¹⁾	Ins- gesamt ¹⁾	darunter steckungs- fähig ²⁾	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig
1950	12 333	4 164	27 945 ³⁾	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1960	2 183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8
1961	441	175	24 893	24 855	0,3	0,1	14,5	14,5
1962	399	202	22 618	22 588	0,2	0,1	13,2	13,2
1963	269	130	22 085	22 054	0,2	0,1	12,9	12,9
1964	a 322	144	20 926	20 913	0,2	0,1	12,3	12,3
1965	336	190	19 627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,5
1966	396	234	18 880	18 867	0,2	0,1	11,1	11,1
1967	388	244	18 356	18 347	0,2	0,1	10,8	10,7
1968	336	186	20 219	20 213	0,2	0,1	11,8	11,8
1969	v 283	159	21 851	21 846	0,2	0,1	12,8	12,8
1970	299	180	23 457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1971	381	230	27 717	27 709	0,2	0,1	16,3	16,3
1972	345	220	35 097	35 087	0,2	0,1	20,6	20,6
1973	554	383	40 596	40 587	0,3	0,2	23,9	23,9
1974	496	324	40 745	40 726	0,3	0,2	24,1	24,1

Nach Bezirken 1974

Hauptstadt Berlin	120	73	5 054	5 054	1,1	0,7	46,4	46,4
Cottbus	19	7	2 117	2 117	0,2	0,1	24,3	24,3
Dresden	33	18	3 720	3 720	0,2	0,1	20,1	20,1
Erfurt	12	11	2 614	2 614	0,1	0,1	20,9	20,9
Frankfurt	25	21	1 379	1 379	0,4	0,3	20,0	20,0
Gera	11	4	1 694	1 694	0,1	0,1	22,9	22,9
Halle	65	43	4 620	4 619	0,3	0,2	24,4	24,4
Karl-Marx-Stadt	43	34	3 717	3 713	0,2	0,2	18,6	18,5
Leipzig	48	30	4 418	4 417	0,3	0,2	30,2	30,2
Magdeburg	22	11	2 573	2 565	0,2	0,1	19,8	19,7
Neubrandenburg	3	2	1 150	1 150	0,0	0,0	18,3	18,3
Potsdam	36	23	2 692	2 691	0,3	0,2	23,9	23,9
Rostock	34	22	3 085	3 081	0,4	0,3	35,6	35,5
Schwerin	22	22	1 173	1 173	0,4	0,4	19,8	19,8
Suhl	3	3	739	739	0,1	0,1	13,4	13,4

D Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Fröhsyphilis und der Connata-Fröhform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. — ²⁾ Syphilis connata Fröhform A 5 a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per-acta-Fälle. — *) G 1 a akute Gonorrhoe, Gib chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, 61c Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.