

2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen

Jahr	Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen					
	Insgesamt männlich weiblich			Insgesamt	männlich	weiblich
				Je 10000 der Bevölkerung ¹⁾		
1955	59 70:5	10 :54:5	2:5 300	22,10	20,35	23,51
1956	48 857	21 40:5	27 394	28,42	27,71	29,01
1965	50 625	25 479	31 140	33,25	32,81	33,03
1966	55 027	24 958	30 069	32,59	32,00	33,09
1967	58 848	20 002	32 240	34,45	34,02	34,81
1968	00 480	27 :*78	33 102	35,40	34,94	35,79
1969	59 045	20 700	32 939	34,93	34,04	35,08
1970	00 054	26 500	33 494	35,21	33,83	30,38
1971	04 772	28 440	30 332	37,99	30,18	39,54
1972	02 550	27 580	34 970	30,70	35,02	38,15
1973	0:5 099	27 :50:5	35 704	37,10	34,78	39,21
1974	0:5 542	27 548	35 994	37,54	35,12	39,04
1975	05 179	28 289	30 890	38,08	30,10	40,87
1976	00 144	28 775	37 309	39,40	30,80	41,02
1977	05 0:50	27 088	37 348	38,79	35,44	41,72

¹⁾ Gleichen Geschlechts.

3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Bezirken

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		(Gonorrhoe	
	Insgesamt ¹⁾	darunter ansteckungsfähig ³⁾	Insgesamt ¹⁾	darunter ansteckungsfähig ³⁾	Insgesamt	darunter ansteckungsfähig	Insgesamt	darunter ansteckungsfähig
	Je 10 000 der Bevölkerung							
1950	12 333	4 104	27 945	23 009	0,7	2,3	15,2	12,9
1955	5 192	709	30 090	30 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1960	2 183	192	25 730	25 404	1,3	0,1	14,9	14,5
1965	330	199	19 027	19 011	0,2	0,1	11,5	11,5
1966	396	234	18 880	18 807	0,2	0,1	11,1	11,1
1967	388	244	18 350	18 347	0,2	0,1	10,8	10,7
1968	330	180	20 219	20 213	0,2	0,1	11,8	11,8
1969	283	159	21 851	21 840	0,2	0,1	12,8	12,8
1970	299	180	23 457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1971	381	230	27 717	27 709	0,2	0,1	10,3	10,3
1972	345	220	35 097	35 087	0,2	0,1	20,0	20,0
1973	554	383	40 590	40 587	0,3	0,2	23,9	23,9
1974	490	324	40 745	40 720	0,3	0,2	24,1	24,1
1975	375	244	39 249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3
1976	417	241	41 380	41 375	0,2	0,1	24,7	24,0
1977	574	388	45 209	45 190	0,3	0,2	27,0	27,0

Nach Bezirken 1977

Hauptstadt Berlin	193	128	4 904	4 904	1,7	1,2	44,1	44,1
Gottbus	4	4	2 170	2 170	0,0	0,0	24,8	24,8
Dresden	72	51	4 480	4 483	0,4	0,3	24,0	24,0
Erfurt	27	10	3 210	3 210	0,2	0,1	25,9	25,9
Frankfurt	14	10	1 800	1 800	0,2	0,1	20,9	20,9
Gera	7	5	1 811	1 808	0,1	0,1	24,0	24,5
Halle	33	18	4 823	4 822	0,2	0,1	25,9	25,9
Karl-Marx-Stadt	50	43	3 000	3 004	0,3	0,2	18,4	18,4
Leipzig	70	32	4 501	4 499	0,4	0,2	31,4	31,4
Magdeburg	42	33	3 159	3 150	0,3	0,3	24,7	24,0
Neubrandenburg	3	3	1 394	1 391	0,0	0,0	22,3	22,3
Potsdam	30	20	3 079	3 079	0,3	0,2	27,0	27,0
Rostock	27	19	3 379	3 379	0,3	0,2	38,7	38,7
Schwerin	9	4	1 804	1 803	0,2	0,1	30,0	30,0
Suhl	2	2	1 023	1 022	0,0	0,0	18,7	18,0

*) Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Frühsyphilis und der Connata-Frühform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. — *) Syphilis connata Frühform A 5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne peracta-Fälle. — ³⁾ G la akute Gonorrhoe, Gib chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G lc Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.