

## 2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen

Jahr	Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen					
	Insgesamt männlich weiblich			Insgesamt	männlich	weiblich
	Je 10000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>					
1955	39 703	16343	23 360	22,10	20,35	23,51
1960	48 857	21463	27 394	28,42	27,71	29,01
1965	56 625	25479	31 146	33,25	32,81	33,63
1966	55 627	24958	30 669	32,59	32,00	33,09
1967	58 848	26602	32 246	34,45	34,02	34,81
1968	60 480	27378	33 102	35,40	34,94	35,79
1969	59 645	26706	32 939	34,93	34,04	35,68
1970	60 054	26560	33 494	35,21	33,83	36,38
1971	64 772	28440	36 332	37,99	36,18	39,54
1972	62 556	27580	34 976	36,70	35,02	38,15
1973	63 099	27335	35 764	37,16	34,78	39,21
1974	63 542	27548	35 994	37,54	35,12	39,64
1975	65 179	28289	36 890	38,68	36,16	40,87
1976	66 144	28775	37 369	39,40	36,86	41,62
1977	65 036	27688	37 348	38,79	35,44	41,72
1978	64 306	27515	36 791	38,38	35,16	41,20

\*) Gleichen Geschlechts.

## 3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Bezirken

Jahr. Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Ins- gesamt <sup>1)</sup>	darunter an- steckungs- fähig <sup>2)</sup>	Ins- gesamt <sup>1)</sup>	darunter an- steckungs- fähig <sup>2)</sup>	Ins- gesamt	darunter an- steckungs- fähig	Ins- gesamt	darunter an- steckungs- fähig
1950	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1960	2 183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8
1965	336	199	19 627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,5
1966	396	234	18 880	18 807	0,2	0,1	11,1	11,1
1967	388	244	18 356	18 347	0,2	0,1	10,8	10,7
1968	336	186	20 219	20 213	0,2	0,1	11,8	11,8
1969	283	159	21 851	21 846	0,2	0,1	12,8	12,8
1970	299	180	23 457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1971	381	230	27 717	27 709	0,2	0,1	16,3	16,3
1972	345	220	35 097	35 087	0,2	0,1	20,6	20,6
1973	554	383	40 596	40 587	0,3	0,2	23,9	23,9
1974	496	324	40 745	40 726	0,3	0,2	24,1	24,1
1975	375	244	39 249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3
1976	417	241	41 386	41 375	0,2	0,1	24,7	24,6
1977	574	388	45 209	45 190	0,3	0,2	27,0	27,0
1978	970	675	49 514	49 494	0,6	0,4	29,5	29,5

## Nach Bezirken 1978

Hauptstadt Berlin	278	167	5 852	5 852	2,5	1,5	52,1	52,1
Cottbus	18	12	2 379	2 379	0,2	0,1	27,1	27,1
Dresden	112	78	4 393	4 380	0,6	0,4	24,1	24,1
Erfurt	37	32	3 263	3 263	0,3	0,3	26,4	26,4
Frankfurt	19	9	2 159	2 159	0,3	0,1	31,0	31,0
Gera	7	7	1 957	1 956	0,1	0,1	26,5	26,5
Halle	79	57	5 434	5 434	0,4	0,3	29,3	29,3
Karl-Marx-Stadt	70	47	4 138	4 137	0,4	0,2	21,2	21,2
Leipzig	203	166	4 580	4 586	1,4	1,2	32,1	32,1
Magdeburg	42	33	3 905	3 903	0,3	0,3	30,6	30,5
Neubrandenburg	12	2	1 476	1 476	0,2	0,0	23,7	23,7
Potsdam	37	29	3 459	3 457	0,3	0,3	31,0	31,0
Rostock	40	27	3 526	3 526	0,5	0,3	40,2	40,2
Schwerin	12	6	1 890	1 890	0,2	0,1	32,1	32,1
Suhl	4	3	1 097	1 096	0,1	0,1	20,0	20,0

») Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Erhsyphilis und der Connata-Frühform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. — <sup>2)</sup> Syphilis connata Frühform A 5 a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II f florida, recidiva — ohne per-acta-Fälle. — <sup>8)</sup> G la akute Gonorrhoe, Gib chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G lc Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.