

## 2. Neugemeldete meldepflichtige Geschwulsterkrankungen

Jahr	Neugemeldete		Geschwulsterkrankungen				
	Insgesamt	indepflichtige männlich	indepflichtige		Insgesamt	männlich	weiblich
			männlich	weiblich			
					Je 10 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>		
1953.....	39 703	16 343	23 360	22,10	20,35	23,51	
1900.....	48 857	21 403	27 394	28,42	27,71	29,01	
1905.....	50 025	25 479	31 140	33,25	32,81	33,03	
1900.....	55 027	24 958	30 009	32,59	32,00	33,09	
1907.....	58 848	26 602	32 240	34,45	34,02	34,81	
1908.....	00 480	27 378	33 102	35,40	34,94	35,79	
1909.....	59 045	- 26 700	32 939	<4,13	34,04	35,08	
1970.....	00 054	20 500	33 494	35,21	33,83	30,38	
1971.....	04 772	28 440	30 332	37,99	36,18	39,54	
1972.....	02 550	27 580	34 970	30,70	35,02	38,15	
1973.....	03 099	27 335	35 704	37,10	34,78	39,21	
1971.....	03 542	27 548	35 994	37,54	35,12	39,04	
1975.....	05 179	28 289	30 890	38,68	30,10	40,87	
1970.....	00 144	28 775	37 309	39,40	30,80	41,02	
1977.....	05 030	27 085	37 348	38,79	35,44	41,72	
1978.....	<4,30	27 515	30 791	38,38	35,10	41,20	
1979.....	04 470	27 052	30 818	38,50	35,29	41,32	

\*) Gleichen Geschlechts.

## 3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Bezirken \*)

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Ins- gesamt <sup>1)</sup>	darunter an- steckungs- fähig <sup>2)</sup>	Ins- gesamt <sup>1)</sup>	darunter an- steckungs- fähig <sup>2)</sup>	Ins- gesamt	darunter an- steckungs- fähig	Ins- gesamt	darunter an- steckungs- fähig
1950.....	12 333	4 164	27 945	23 609	6,7	2,3	15,2	12,9
1955.....	5 192	709	36 090	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1900.....	2 183	192	25 73	25 404	1,3	0,1	14,9	14,8
1905.....	330	199	19 027	19 011	0,2	0,1	11,5	11,5
1900.....	390	234	18 880	18 807	0,2	0,1	11,1	11,1
1967.....	388	244	18 356	18 317	0,2	0,1	10,8	10,7
1908.....	330	180	20 219	20 213	0,2	0,1	11,8	11,8
1909.....	283	159	21 851	21 840	0,2	0,1	12,8	12,8
1970.....	299	180	23 457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1971.....	381	230	27 717	27 709	0,2	0,1	10,3	10,3
1972.....	345	220	35 097	35 087	0,2	0,1	20,0	20,0
1973.....	554	383	40 590	40 587	0,3	0,2	23,9	23,9
1974.....	490	324	40 745	40 726	0,3	0,2	24,1	24,1
1975.....	375	v 244	39 249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3
1970.....	417	241	41 386	41 375	0,2	0,1	24,7	24,0
1977.....	574	388	45 209	45 190	0,3	0,2	27,0	27,0
1978.....	970	075	49 514	49 494	0,0	0,4	29,5	29,5
1979.....	912	607	50 638	50 621	0,5	0,4	30,2	30,2

## Nach Bezirken 1979

Hauptstadt Berln ...	207	138	0 380	6 380	2,4	1,2	56,3	50,3
Cottbus.....	45	34	2 439	2 435	0,5	0,4	27,7	27,6
Dresden.....	80	04	4 405	4 402	0,5	0,3	24,0	24,6
Erfurt.....	18	12	3 122	3 122	0,1	0,1	25,2	25,2
Frankfurt.....	38	32	2 105	2 104	0,5	0,5	30,1	30,1
Gera.....	14	10	1 023	1 020	0,2	0,1	22,0	21,9
Halle.....	85	49	5 739	5 737	0,5	0,3	31,1	31,1
Karl-Marx-Stadt.....	70	56	4 345	4 345	0,4	0,3	22,4	22,4
Leipzig.....	131	108	4 569	4 568	0,0	0,8	32,2	32,1
Magdeburg.....	04	47	3 850	3 850	0,5	0,4	30,2	30,2
Neubrandenburg.....	11	0	1 834	1 833	0,2	0,1	29,5	29,4
Potsdam.....	27	19	3 785	3 785	0,2	0,2	33,9	33,9
Rostock.....	35	28	3 930	3 930	0,4	0,3	44,0	44,0
Schwerin.....	14	11	1 413	1 413	0,2	0,2	24,0	24,0
Suhl.....	1	-	1 039	1 037	0,0	-	19,0	18,9

\*) Ab 1. Januar 1901 werden nur die Diagnosen der Frñhsyphilis und der Connata-Frñhform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfasst. - 1) Syphilis connata Frñhform A 5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis III florida, recidiva - ohne per-acta-Fälle. - 2) G la akute Gonorrhoe, G lb chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G lc Gonokokkeninfektion der Augen - unbehandelt.