

Neugemeldete meldepflichtige bösartige Geschwulsterkrankungen¹⁾

Jahr	Insgesamt	männlich	weiblich	Je 10 000 der Bevölkerung ²⁾		
				Insgesamt	männlich	weiblich
1955	40 129	16 960	23 169	22,36	21,15	23,34
1960	45 328	20 179	25 149	26,29	26,00	26,53
1965	48 985	22 535	26 450	28,78	29,03	28,57
1966	50 046	22 764	27 282	29,34	29,20	29,45
1967	51 896	23 760	28 136	30,38	30,38	30,38
1968	52 893	24 572	28 321	30,96	31,36	30,62
1969	53 035	24 603	28 432	31,06	31,36	30,80
1970	53 076	24 212	28 864	31,11	30,84	31,35
1971	53 478	24 599	28 879	31,35	31,26	31,42
1972	53 233	24 502	28 731	31,23	31,11	31,34
1973	53 622	24 602	29 020	31,58	31,31	31,82
1974	53 804	24 610	29 194	31,79	31,37	32,15
1975	54 979	25 186	29 793	32,63	32,20	33,00
1976	55 121	25 340	29 781	32,84	32,46	33,17
1977	54 523	24 803	29 720	32,52	31,74	33,20
1978	52 893	24 121	28 772	31,57	30,82	32,22
1979	52 219	23 854	28 365	31,19	30,45	31,84
1980	52 368	23 757	28 611	31,29	30,28	32,18
1981	53 192	23 870	29 322	31,78	30,36	33,05
1982	53 137	24 104	29 033	31,82	30,70	32,82
1983	53 885	24 503	29 382	32,27	31,14	33,27
1984	54 028	24 508	29 520	32,41	31,15	33,53
1985	53 654	24 366	29 288	32,24	30,96	33,38

1) Auf der Grundlage des Krebsregistersentsprechend der internationalen Methodik; ohne Basaliome der Haut. - 2) Gleichen Geschlechts.

Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt ¹⁾	darunter an- an- steckungs- fähig ²⁾	Insgesamt ¹⁾	darunter steckungs- fähig	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig	Insgesamt	darunter ansteckungs- fähig
	Je 10 000 der Bevölkerung							
1950	12 333	4 164	27945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1955	5 192	769	36690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1960	2 183	192	25736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8
1965	336	199	19627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,5
1970	299	180	23457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1975	375	244	39249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3
1980	951	564	50861	50 835	0,6	0,3	30,4	30,4
1981	758	463	50302	50 287	0,5	0,3	30,1	30,0
1982	516	305	50086	50 071	0,3	0,2	30,0	30,0
1983	428	196	50299	50 293	0,3	0,1	30,1	30,1
1984	342	180	49089	49 078	0,2	0,1	29,4	29,4
1985	327	156	49616	49 606	0,2	0,1	29,8	29,8
1986	419	269	44668	44 654	0,3	0,2	26,9	26,9
1987	596	335	34919	34 914	0,4	0,2	20,9	20,9

Nach Bezirken 1987

Hauptstadt Berlin . . .	63	1	4 162	4 162	0,5	0,0	33,3	33,3
Cottbus	33	25	1 699	1 699	0,4	0,3	19,2	19,2
Dresden	63	31	3 596	3 595	0,4	0,2	20,3	20,3
Erfurt	5	5	2 076	2 076	0,0	0,0	16,7	16,7
Frankfurt	15	11	1 468	1 468	0,2	0,1	20,6	20,6
Gera	16	6	1 193	1 190	0,2	0,1	16,1	16,0
Halle	26	18	3 821	3 821	0,2	0,1	21,4	21,4
Karl-Marx-Stadt	51	23	2 581	2 581	0,3	0,1	13,8	13,8
Leipzig	233	172	3 302	3 302	1,7	1,3	24,1	24,1
Magdeburg	37	21	2 856	2 856	0,3	0,2	22,8	22,8
Neubrandenburg . . .	4	1	1 151	1 151	0,1	0,0	18,5	18,5
Potsdam	13	5	2 267	2 267	0,1	0,0	20,2	20,2
Rostock	31	15	2 935	2 934	0,3	0,2	32,1	32,1
Schwerin	4	1	1 122	1 122	0,1	0,0	18,9	18,9
Suhl	2	—	690	690	0,0	0,0	12,5	12,5

1) Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Frühsyphilis und der Connata-Frühform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt.

• 2) Syphilis connata Frühform A 5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva - ohne peracta-Fälle. - 3) G 1a akute Gonorrhoe, G 1b chronische Gonorrhoe der Jrogenitalsystems. G 1c Gonokokkeninfektion der Augen • unbehandelt.