

Neugemeldete meldepflichtige bösartige Geschwulsterkrankungen"

Jahr	Insgesamt		männlich		weiblich		Insgesamt	männlich		weiblich	
	Je 10 000 der Bevölkerung ²										
1955	40 129	16 960	23 169	22,36	21,15	23,34					
1960	45 328	20 179	25 149	26,29	26,00	26,53					
1965	48 776	22 467	26 309	28,61	28,93	28,41					
1970	53 640	24 518	29 122	31,45	31,23	31,63					
1971	54 227	25 021	29 206	31,81	31,83	31,79					
1972	54 574	25 244	29 330	32,02	32,06	31,99					
1973	54 496	25 114	29 382	32,09	31,96	32,21					
1974	54 744	25 132	29 612	32,35	32,04	32,61					
1975	55 558	25 512	30 046	32,97	32,62	33,28					
1976	55 546	25 559	29 987	33,09	32,74	33,40					
1977	55 442	25 308	30 134	33,07	32,39	33,67					
1978	53 801	24 610	29 191	32,11	31,44	32,69					
1979	53 100	24 309	28 791	31,71	31,02	32,31					
1980	53 318	24 270	29 048	31,86	30,93	32,67					
1981	53 686	24 153	29 533	32,08	30,71	33,29					
1982	53 731	24 456	29 275	32,18	31,15	33,10					
1983	54 397	24 785	29 612	32,58	31,50	33,53					
1984	54 846	24 904	29 942	32,90	31,65	34,01					
1985	53 649	24 365	29 284	32,23	30,96	33,38					
1986	53 908	24 937	28 971	32,43	31,64	33,13					
1987	54 790	24 927	29 863	32,92	31,50	34,21					

1) Auf der Grundlage des Krebsregisters entsprechend der internationalen Methodik; ohne Basaliome der Haut. • 2) Gleichen. Geschlechts.

Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe

Jahr Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt ¹	darunter an- steckungs- fähig ²	Insgesamt ¹	darunter an- steckungs- fähig ³	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig
Je 10 000 der Bevölkerung								
1950	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1960	2 183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8
1965	336	199	19 627	19 611	0,2	0,1	11,5	11,5
1970	299	180	23 457	23 445	0,2	0,1	13,8	13,7
1975	375	244	39 249	39 238	0,2	0,1	23,3	23,3
1980	951	564	50 861	50 835	0,6	0,3	30,4	30,4
1981	758	463	50 302	50 287	0,5	0,3	30,1	30,0
1982	516	305	50 086	50 071	0,3	0,2	30,0	30,0
1983	428	196	50 299	50 293	0,3	0,1	30,1	30,1
1984	342	180	49 089	49 078	0,2	0,1	29,4	29,4
1985	327	156	49 616	49 606	0,2	0,1	29,8	29,8
1986	419	269	44 668	44 654	0,3	0,2	26,9	26,9
1987	596	335	34 919	34 914	0,4	0,2	20,9	20,9
1988	837	511	28 635	28 633	0,5	0,3	17,2	17,2
1989	839	578	22 617	22 614	0,5	0,3	13,6	13,6

Nach Bezirken 1989

Berlin (Ost)	45	—	2 557	2 557	0,3	0,0	19,8	19,8
Cottbus	20	16	1 151	1 150	0,2	0,2	13,0	13,0
Dresden	77	61	2 104	2 104	0,4	0,3	12,0	12,0
Erfurt	27	24	1 585	1 585	0,2	0,2	12,8	12,8
Frankfurt	17	9	924	924	0,2	0,1	13,0	13,0
Gera	6	3	689	689	0,1	0,0	9,3	9,3
Halle	65	41	2 844	2 844	0,4	0,3	16,1	16,1
Chemnitz	45	25	1 652	1 651	0,2	0,1	8,9	8,9
Leipzig	455	350	2 266	2 266	3,4	2,6	16,8	16,8
Magdeburg	27	14	1 562	1 562	0,2	0,1	12,5	12,5
Neubrandenburg	7	6	633	633	0,1	0,1	10,2	10,2
Potsdam	16	10	1 527	1 527	0,1	0,1	13,6	13,6
Rostock	27	18	1 848	1 847	0,3	0,2	20,1	20,1
Schwerin	3	1	738	738	0,0	0,0	12,4	12,4
Suhl	2	—	537	537	0,0	0,0	9,8	9,8

1) Ab 1. Januar 1961 werden nur die Diagnosen der Fröhsyphilis und der Connata-Fröhform sowie der unbehandelten Gonokokkeninfektion erfaßt. • 2) Syphilis connata Fröhform A 5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva - ohne peracta-Fälle. • 3) G 1a akute Gonorrhoe, G 1b chronische Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G 1c Gonokokkeninfektion der Augen • unbehandelt.